

BRAVECTO® Spot on for Cats



محلول Spot on ضد کک و کنه براوکتو



- شروع ایمنی ۱۲ ساعت برای کک ها (C.felis) و ۴۸ ساعت برای کنه ها (Ixodes ricinus)
- کنترل آلودگی مجدد با کک و کنه در طی دوره ۳ ماهه بعد از مصرف
- جلوگیری از آلرژی پوستی ناشی از آلودگی مجدد با کک و کنه
- تا ۵ برابر حد مطلوب ایمن می باشد.
- بسیار موثر در برابر کک های مقاوم به فیپرونیل



NIKO GENE ARYA

www.nikogene.com

www.nikogene.com

BRAVECTO® Spot on for Cats

گروه دارویی: ضدانگل بصورت محلول بی رنگ تا مایل به زرد محتوی ماده موثره Fluralaner

گونه هدف: گربه

موارد مصرف: جهت کنترل و درمان آلودگی به کک و کنه در گربه ها به مدت ۳ ماه

روش مصرف:

در گربه ها با وزن ۱/۲ تا ۲/۸ کیلوگرم، تیوب ۱۱۲/۵ میلی گرمی براوکتو و وزن ۲/۸ تا ۶/۲۵ کیلوگرم، تیوب ۲۵۰ میلی گرمی براوکتو و وزن ۶/۲۵ تا ۱۲/۵ کیلوگرم، تیوب ۵۰۰ میلی گرمی استفاده شود.

توصیه روش مصرف:

ابتدا قبل از استفاده ساشه را باز کنید. با چرخاندن یک دور کامل درپوش، تیوب باز شده و آماده برای استفاده می‌باشد. برای استفاده آسان، گربه باید ایستاده یا بر روی شکم بخوابد. نوک تیوب را در پشت سر گربه قرار دهید. تیوب را به آرامی فشار دهید و تمام محتویات را مستقیماً روی پوست گربه قرار دهید. BRAVECTO® Spot on را در یک نقطه از پوست گربه (گربه های تا وزن ۶/۲۵ کیلوگرم) یا دو نقطه (گربه های با وزن بیش از ۶/۲۵ کیلوگرم) در پشت سر و روی کمر گربه استفاده نمایید. محلول را در ناحیه ای استفاده نمایید که قابل لیسیدن توسط گربه نباشد. در صورت لیسیدن و بلع ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند. در صورت استفاده همزمان محصول در چند گربه، برای جلوگیری از لیسیدن داروی مصرف شده توسط سایر گربه ها تا زمانی که محصول خشک شود جدا از هم نگه دارید.

مکانیسم اثر:

محلول Bravecto® spot-on حاوی Fluralaner. حشره کش و کنه کش سیستمیک با نیمه عمر ۱۲ روز و ماندگاری ۳ ماه در بدن می‌باشد. این محلول بصورت موضعی جذب شده، حداکثر غلظت پلازما آن ۳ تا ۲۱ روز بعد از مصرف به دست می‌آید. در طول مدت ایمنی زایی این محصول، چرخه زندگی کک قبل از مرحله تخم گذاری شکسته می‌شود. همچنین غلظت پلاسمایی موثر و ماندگار محصول در بدن مانع از حضور کک و کنه جدید در طول ۳ ماه بعد از مصرف شده و مواردی مانند flea allergy dermatitis را کنترل می‌کند.

عوارض جانبی:

به ندرت ممکن است واکنش های پوستی خفیف و گذرا در محل استفاده و مشکلات کوتاه مدت پس از مصرف دارو شامل لرزش، بی‌اشتهایی یا استفراغ و ترشح بیش از حد بزاق مشاهده شود.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

- در صورت مشاهده واکنش ازدیاد حساسیت از مصرف خودداری شود. از تماس با چشم حیوان خودداری شود. مستقیماً روی ضایعات پوستی استفاده نشود. بلافاصله پس از استفاده محصول، دست ها را کاملاً با آب و صابون بشویید.
- محصول بسیار قابل اشتعال است. از گرما، جرقه، شعله یا سایر منابع احتراق دور باشد.
- در بچه گربه های کمتر از ۹ هفته یا وزن کمتر از ۱/۲ کیلوگرم استفاده نشود و همچنین اینتروال (فاصله زمانی تجویز) کمتر از ۸ هفته نباشد.
- در دوران آبستنی و شیردهی استفاده نشود.

عمر قفسه ای: Bravecto® spot-on 112.5 mg : ۲۴ ماه و Bravecto® spot-on 250 mg , 500 mg : ۳۶ ماه و در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد یا کمتر در مکان خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی: هر بسته شامل ۱ یا ۲ عدد تیوب آلومینیومی با درب پلی پروپیلن می‌باشد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



شرکت پخش سراسری نیکان پخش

نیکان پخش به آفرین

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، پلاک ۲۳، طبقه اول
تلفن: ۵۲۸۹۵ - ۰۲۱
فکس: ۶۶۹۴۲۴۹۵ - ۰۲۱

NIKO GENE