


BRAVECTO® chewable tablets for dogs

قرص جویدنی ضدکک و کنه براوکتو



- کنترل و درمان کک و کنه (درمان قطعی طی ۸ تا ۱۲ ساعت)
- قابل استفاده در دوران آبستنی و شیردهی
- ایمن برای استفاده در نژادهای MDR1 (حساس به مصرف آیورمکتین)
- کمک به کنترل flea allergy dermatitis
- موثر در برابر کک های مقاوم به فیپرونیل
- دوره ایمنی ۳ ماهه متعاقب مصرف برای انواع کک و کنه



BRAVECTO® chewable tablets for dogs

گروه دارویی: ضدانگل بصورت قرص خوارکی محتوی ماده موثره Fluralaner
گونه هدف: سگ

موارد مصرف: جهت کنترل آلودگی به کک و کنه در سگ ها
اطلاعات کلی:

آزمایش های کنترل شده نشان می دهد که پس از درمان با Bravecto، یک حشره کش و کنه کش سیستمیک با مدت اثر طولانی است که فعالیت کشنده سریع و مداوم خود را ظرف مدت ۳ ماه در کنه (بالغ و جوان) Haemaphysalis longicornis (NZ Cattle Tick) و کک (Ctenocephalides) فراهم می کند.

آزمایش های کنترل شده نشان می دهد که پس از درمان با Bravecto، ۹۶/۸٪ از کنه های روی بدن سگ ظرف مدت ۸ ساعت و ۱۰۰٪ کنه ها ظرف مدت ۱۲ ساعت از بین می روند. ۳ ماه پس از درمان، حدود ۹۷/۱٪ از کنه های جدید ظرف مدت ۱۲ ساعت کشته می شوند. متعاقب درمان با Bravecto ۹۹٪ کک های روی بدن سگ ظرف مدت ۸ ساعت و ۱۰۰٪ ظرف مدت ۱۲ ساعت از بین می روند. ۳ ماه پس از درمان، ۹۵/۷٪ کک های جدید که بر روی بدن سگ قرار می گیرند ظرف مدت ۸ ساعت از بین می روند.

موارد عدم مصرف: در توله سگ های کمتر از ۸ هفته یا وزن کمتر از ۲ کیلوگرم نباید استفاده شود. در صورت حساسیت به ماده فعال یا هر یک از مواد دیگر، از مصرف قرص خودداری کنید. در فواصل زمانی کمتر از ۸ هفته استفاده نشود.

روش مصرف:

اگر وزن بدن سگ ۲ تا ۴/۵ کیلوگرم باشد از قرص ۱۱۲/۵ میلی گرمی، اگر وزن بدن ۴/۵ تا ۱۰ کیلوگرم باشد از قرص ۲۵۰ میلی گرمی، اگر وزن بدن سگ ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم باشد از قرص ۵۰۰ میلی گرمی، اگر وزن بدن ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم باشد از قرص ۱۰۰۰ میلی گرمی و اگر ۴۰ تا ۵۶ کیلوگرم باشد از قرص ۱۴۰۰ میلی گرمی استفاده شود.

قرص جویدنی براوکتو در ۵ سایز با توجه به وزن حیوانات قابل مصرف است. در هر گروه وزنی ۱ قرص کامل باید توسط سگ خورده شود. مصرف قرص با معده پر می باشد. در صورتی که حیوان از جویدن قرص امتناع کرد، می توان قرص را همراه با غذا و یا مستقیماً درون دهان حیوان قرار داد. قرص جویدنی شکسته و یا تقسیم نشود. برای سگ هایی با وزن بالای ۵۶ کیلوگرم، از ترکیب دو قرص که نزدیک به وزن بدن سگ باشد استفاده نمایید.

برای کنترل بهینه آلودگی کک و کنه، قرص جویدنی Bravecto باید در فواصل ۳ ماه تجویز شود. برای درمان جرب Demodex canis یک دز از محصول تجویز گردد. از آنجایی که دمودکوزیس یک بیماری چند عاملی است، توصیه می شود هر عامل زمینه ای را نیز درمان کنید. برای درمان جرب Sarcoptes scabiei var. canis (sarcoptic mange) را در طول فاصله بین دز (اینتروال) دفعات درمان بر اساس نسخه دکتر دامپزشک باشد.

فارماکوکنیتیک: Fluralaner پس از مصرف خوارکی به راحتی جذب شده و به حداقل غلظت پلاسمای ۱ روز می رسد. Fluralaner به صورت سیستمی توزیع می شود و به بالاترین غلظت در چربی و سپس کبد، کلیه و ماهیچه می رسد. ماندگاری طولانی، حذف آهسته از پلاسمای نیمه عمر = ۱۲ روز و فقدان متابولیسم گسترده، غلظت موثر Fluralaner را در طول فاصله بین دز (اینتروال) فراهم می کند.

عوارض جانبی: ممکن است علایم خفیف و گذرا گوارشی شامل استفراغ، اسهال، بی اشتہایی، ریزش بzac مربوط به روش تجویز قرص مشاهده شود. در صورت رخداد واقعه و هرگونه نگرانی به دامپزشک مراجعه کنید.

عمر قفسه ای: ۲ سال در دمای محیط به دور از مواد غذایی و همچنین در بسته بندی اصلی برای جلوگیری از رطوبت نگهداری شود. بسته بندی: جعبه های مقوایی حاوی ورق های قرص (۱، ۲ یا ۴ عددی) که هر دو طرف ورقه ها آلومینیومی است.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



شرکت پخش سراسری نیکان پخش

نیکان پخش به آفرین