


# Nobivac® L4

واکسن چهار گانه لپتوسپیرا



- تهییه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- مدت ایمنی متعاقب واکسیناسیون ۱ سال
- شروع ایمنی ۳ هفته بعد از تزریق
- قابل استفاده در دوران آبستنی
- ایمنی زایی فعال در سگ ها برای کاهش عفونت و دفع ادراری



# Nobivac® L4

ترکیب واکسن: هر دز واکسن علیه بیماری لپتوسپیروز حاوی:

-L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vera (strain Ca-12-000) 3550–7100 U<sup>1</sup>

-L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) 290–1000 U<sup>1</sup>

-L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) 500–1700 U<sup>1</sup>

-L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas (strain Gr-01-005) 650–1300 U<sup>1</sup>

<sup>1</sup> بر اساس آنتی ژن الایزا

شكل و نوع واکسن: واکسن کشته

مورد مصرف: واکسن کشته شده Nobivac® L4 جهت این سازی فعال علیه بیماری لپتوسپیروز ناشی از L. Canicola در سگ ها می باشد. این واکسن علاوه بر کاهش عفونت منجر به کاهش دفع ادراری در حیوانات مبتلا می شود.

دز و نحوه مصرف:

ادز واکسن (1 میلی لیتر) Nobivac® L4 را به صورت زیر جلدی (زیر پوستی) تزریق کنید. قبل از استفاده اجازه دهدید واکسن به دمای محیط ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد) برسد. اولین دز تزریق واکسن در ۹-۶ هفتگی و تزریق دوم در ۱۰-۱۳ هفتگی توصیه می شود. تجویز بوستر سالانه می باشد. در صورت استفاده همزمان، ادز واکسن Nobivac شامل canine parvovirus, canine adenovirus type2, canine distemper virus و canine parainfluenza virus با ادز (1 میلی لیتر) واکسن Nobivac® مخلوط نمایید و قبل از استفاده اجازه دهدید به دمای محیط ۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد) برسد، سپس به صورت زیر جلدی تزریق گردد.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

■ دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.

■ واکسن باید طبق نظر دامپزشک مصرف شود.

■ با هیچ گونه واکسن زنده یا مخصوصات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.

■ دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی اطلاع نگهداری شود.

■ از ورود اشتباه سرنگ به فرد تزریق کننده یا تماس با چشم خودداری شود، در صورت تحریک چشم فوراً به پزشک مراجعه کنید و بروشور یا برچسب آن را به پزشک نشان دهید.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ های بیمار خودداری شود.

عوارض جانبی:

ممکن است یک تورم جزئی و موقت در محل تزریق چند روز پس از واکسیناسیون رخ دهد که در لمس سفت و دردناک است. این تورم ۱۴ روز پس از واکسیناسیون کم و یا ناپدید می شود. در موارد بسیار نادر ممکن است واکنش ازدیاد حساسیت رخ دهد که بدون فوت وقت سریعاً آنتی هیستامین، کورتیکواستروئید یا آدنالین باید تجویز شود. ممکن است افزایش ملایم دمای بدن و همچنین به ندرت در توله سگ ها کاهش فعالیت و اشتها پس از واکسیناسیون رخ دهد.

تداخل با سایر واکسن ها: واکسن Nobivac® L4 می تواند مخلوط با سایر واکسن های Nobivac شامل دیستمپر ویروس سگ سانان، آدنووپیروس تیپ ۲، پارووپیروس و یا ویروس پاراآنفلوآنزا به صورت زیر جلدی تزریق شود. وقی با این واکسن ها بصورت مخلوط استفاده شود، از نظر کارایی و ایمنی تفاوتی با Nobivac® L4 به تنها بی ندارد. هیچ اطلاعاتی در مورد ایمنی و اثربخشی این واکسن در استفاده با سایر محصولات دامپزشکی به جز محصولات ذکر شده در بالا در دسترس نیست.

عمر قفسه ای: ۲۱ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.

بسته بندی: بسته بندی بصورت ویال های تک دزی ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی واکسن Nobivac® L4 محصول شرکت MSD هلند می باشد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



نیکان پخش به آفرین

شرکت پخش سراسری نیکان پخش