

# Nobivac® Tricat Trio



واکسن سه گانه مخصوص گربه



تھیہ شدہ با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا



[www.npb.co.ir](http://www.npb.co.ir)

  
NIKO GENE ARYA

[www.nikogene.co.ir](http://www.nikogene.co.ir)

# Nobivac® Tricat Trio

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن لیوفیلیزه حاوی  $5.2 \text{ Log}_{10} \text{ pfu}$  و  $4.6 \text{ Log}_{10} \text{ G2620A pfu}$  و  $4.3 \text{ Log}_{10} \text{ CCID}_{50} \text{ F9}$  و  $4.3 \text{ Log}_{10} \text{ MW-1}$  سویه (FPLV) عامل بیماری کلسی ویروس (FCV) می باشد.

شكل و نوع واکسن: واکسن زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه

مورد مصرف: واکسن سه گانه جهت جلوگیری از بروز بیماری Feline panleucopenia و Calcivirus Feline herpes virus type1 در گربهها دز و نحوه مصرف:

ابتدا محتوى واکسن را در حلال مخصوص Nobivac® Tricat Trio به خوبی حل کنید. از تمام محتوى واکسن استفاده کرده و بصورت زیر جلدی تزریق کنید. اولین دز تزریق واکسن در ۸-۹ هفتگی، تزریق دوم در ۱۲ هفتگی و تزریق سوم در ۲۰-۱۶ هفتگی (در صورت دلخواه) توصیه می شود.

زمان شروع ایمنی و افزایش تیتر:

- برای عفونت های FHV & FCV، ۴ هفته
- برای عفونت های FPLV، ۳ هفته

ماندگاری ایمنی متعاقب با واکسیناسیون برای FPLV & FHV، ۱ سال و برای عفونت های با منشأ FCV، ۳ سال می باشد. در نتیجه تکرار واکسیناسیون برای ویروس های FHV & FCV، سالیانه و برای ویروس FPLV، هر ۳ سال یکبار می باشد.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

دقت کنید که واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.

واکسن باید طبق نظر دکتر دامپزشک مصرف شود.

با هیچ گونه واکسن زنده و یا محصولات ایمنولوژیکی مخلوط نگردد.

مطلوب آینه دفع زباله، تمام سرنگ های خالی دور ریخته شوند و تحت هیچ شرایطی مورد استفاده مجدد قرار نگیرند.

دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی اطلاع نگهداری شود.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون گربه های بیمار، گربه های آبستن و گربه های شیرده خودداری شود.

عوارض جانبی:

ممکن است برای مدت ۱ تا ۲ روز محل تجویز متورم و دردناک باشد.

به ندرت ممکن است در اولین روز بعد از واکسیناسیون با افزایش دمای بدن و بی حالی مواجه شویم.

تا ۲ روز پس از تزریق در برخی از گربه ها عطسه، سرفه، ترشحات بینی یا کاهش اشتها ممکن است ظاهر شود.

در موارد بسیار نادر ممکن است واکنش های ازدیاد حساسیت مثل خارش، تنگی نفس، استفراغ و اسهال دیده شود.

شرایط نگهداری: واکسن در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و حلال واکسن در دمای اتاق و زیر ۲۵ درجه سانتی گراد، دور از نور حمل و نگهداری شود.

مدت نگهداری:

واکسن در بسته بندی کارخانه ای تا ۳۳ ماه و حلال تا ۵ سال می باشد.

در صورت آماده سازی واکسن برای تزریق تا ۳۰ دقیقه می باشد.

بسته بندی: ویال های شیشه ای و تک دزی واکسن و حلال Nobivac® Tricat Trio در بسته های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می گردد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



شرکت پخش سراسری نیکان پخش

نیکان پخش به آفرین