

# Panacur® Equine Oral Paste 18.75%

داروی ضدانگل اختصاصی اسب و سایر تک سمی ها  
خمیر خوراکی حاوی طعم دهنده سیب و دارچین



■ درمان مراحل بالغ و نابالغ نماتدهای دستگاه گوارش  
■ درمان عفونت ناشی از Strongyle های نابالغ و مهاجر



[www.npb.co.ir](http://www.npb.co.ir)

  
NIKO GENE ARYA

[www.nikogene.co.ir](http://www.nikogene.co.ir)

# Panacur® Equine Oral Paste 18.75%

گروه دارویی: ضدانگل

شکل دارویی: خمیر خوراکی

ترکیب: هر گرم خمیر خوراکی حاوی ۱۸۷/۵ میلی‌گرم فنبندازول است (به عبارت دیگر یک سرنگ ۲۴ گرمی دارای ۴/۵ گرم فنبندازول و ۰/۲٪ طعم دهنده سیب و دارچین می‌باشد).

گونه هدف: اسب و سایر تک سمیان

موارد مصرف:

- درمان مراحل بالغ و نابالغ نماتودهای دستگاه گوارش
  - درمان عفونت ناشی از Strongyle های نابالغ و مهاجر
  - اندوپارازیت‌های حساس مراحل بالغ و نابالغ، شامل: strongyles های بزرگ و کوچک، Ascarids، Oxyuris equi، Strongyloides spp.، Dictyocaulus arnfieldi
- روش مصرف: می‌توان در غذای اسب مخلوط کرد یا بطور مستقیم سرنگ را در محوطه دهانی تخلیه کرد.

مقدار مصرف:

- دز توصیه شده ۷/۵ mg/kg فنبندازول خالص یا به عبارتی ۲۴ گرم (یک سرنگ) برای هر ۶۰۰ کیلوگرم
  - در اسهال ناشی از Strongyloides westeri، که با لیسیدن کره اسب‌ها ظاهر می‌شود دز درمانی توصیه شده، ۵۰ mg/kg فنبندازول خالص و به عبارت دیگر ۲۴ گرم پاناکور (یک سرنگ) برای هر ۹۰ کیلوگرم وزن بدن
  - در عفونت‌های مرحله مخاطی ناشی از Trichonema spp. (استرانژیل‌های کوچک) دز توصیه شده ۳۰ mg/kg؛ برای درمان عفونت‌های Strongylus edentatus و Strongylus vulgaris که در آن‌ها انگل وارد مرحله مهاجرت شده، دز درمانی ۶۰ mg/kg می‌باشد.
  - برای کنترل و درمان مرحله مهاجرت، تشکیل لاروهای بافتی با استرانژیل‌های بزرگ، مخاط آلوده با لاروهای کیستیک مرحله ۳ و ۴ استرانژیل‌های کوچک و ممانعت از کیستیک شدن لاروهای مخاط در مرحله ۳؛ دز درمانی توصیه شده ۱ سرنگ پاناکور به ازاء ۶۰۰ کیلوگرم وزن بدن تا ۵ روز متوالی می‌باشد.
- مکانیسم اثر: فنبندازول یک داروی ضد انگل از گروه کاربامات بنزیمیدازول هست که با ممانعت از پلیمریزاسیون توبولین‌ها به میکروتوبول‌ها، انرژی در دسترس انگل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فارماکوکینتیک: جذب فنبندازول آهسته، از طریق مجرای گوارشی بوده و متابولیسم آن در کبد صورت می‌گیرد. بیشترین ذخیره فنبندازول در کبد هست و متابولیت‌های آن بیشتر از طریق مدفوع و کمتر از طریق ادرار و شیر دفع می‌گردد.

مصرف در زمان بارداری: مصرف دارو در طول دوره آبستنی و شیردهی مجاز می‌باشد.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- با تجویز دکتر دامپزشک مصرف گردد.
- دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی اطلاع نگهداری شود.
- عدم استفاده طولانی مدت از داروهای ضدانگل هم‌کلاس با پاناکور برای پیشگیری از مقاومت دارویی
- محاسبه دقیق وزن حیوان برای تعیین دز مناسب
- جلوگیری از تجویز دارو پایین‌تر از دز درمانی مناسب و طولانی شدن روند درمان
- با شمارش تعداد تخم‌های دفع شده در مدفوع، مناسب بودن روند درمان، دز درمانی و داروی انتخابی را ارزیابی کنید.
- استفاده از دستکش مناسب و شست و شوی مناسب دست‌ها بعد از اتمام کار
- عدم استفاده در موارد حساسیت به ماده اصلی
- مطابق با آیین‌نامه دفع زباله، تمام سرنگ‌های خالی دور ریخته شوند و تحت هیچ شرایطی مورد استفاده مجدد قرار نگیرند.

عمر قفسه‌ای: در بسته بندی اصلی ۳ سال

شرایط نگهداری: در دمای زیر ۲۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی: هر سرنگ پاناکور ۲۴ گرم وزن دارد و در کارتن‌های ۱۰ یا ۲۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید شده است.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



شرکت پخش سراسری نیکان پخش

نیکان پخش به آفرین

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، پلاک ۲۳، طبقه اول

تلفن: ۰۲۱ - ۵۲۸۹۵

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۴۲۴۹۵

www.npb.co.ir

info@npb.co.ir

NIKO GENE