


LADOXYN



داکسی سیکلین ۵۰٪

(گرانول های محلول در آب) مخصوص ماکیان و بوقلمون



اولین داکسی سیکلین با غلظت ۵۸۰ میلی گرم در ایران

درمان بیماریهایی با منشأ باکتریایی حساس به داکسی سیکلین

قدرت جذب بالا در دستگاه گوارش

گرانول های زرد رنگ

لادوکسین

ترکیب: داکسی سیکلین هیکلات: ۵۸۰ میلی گرم در هر گرم

شکل دارویی: گرانول زرد رنگ محلول در آب

موارد مصرف: درمان بیماریهای با منشاء باکتریهای حساس به داکسی سیکلین نظیر میکوپلاسما گالی سپتیكوم (CRD)، میکوپلاسما سینوویه، E.coli، سالمونلا، اوی باکتریوم (عامل کوریزا)، پاستورلا، ORT، عفونتهای استافیلوکوکوسی و استریتوکوکی

مقدار مصرف:

■ **ماکیان:** تجویز روزانه ۲۰ میلی گرم داکسی سیکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای پنج روز متوالی (معادل با ۴۰ میلی گرم از محصول لادوکسین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن)

■ **بوقلمون:** تجویز روزانه ۲۵ میلی گرم داکسی سیکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای پنج روز متوالی (معادل با ۵۰ میلی گرم از محصول لادوکسین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن)

موارد احتیاط:

■ در صورت وجود حساسیت به هر یک از ترکیبات فعال تشکیل دهنده، دارو منع مصرف دارد.

■ در صورت تایید مقاومت به تتراسیکلین بخاطر احتمال وجود مقاومت متقاطع با داکسی سیکلین از مصرف دارو اجتناب گردد.

■ در پرندگان مبتلا به نارسائی کبدی منع مصرف دارد.

منع مصرف: در گله تخمگذاری که تخم مرغ یا تولید آنها به مصرف انسان می رسد. فقط برای مصرف دامپزشکی

فارماکودینامیک محصول: داکسی سیکلین یک محصول نیمه صنعتی از تتراسیکلین هست. که با عملکرد باکتریواستاتیک بر روی طیف وسیعی از باکتریها اثر می گذارد و با ممانعت از رشد باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی، بی هوازی و هوازی علی الخصوص میکوپلاسما گالی سپتیكوم عمل می نماید.

فارماکوکینتیک محصول: با سرعت بالا و به میزان قابل توجهی از دستگاه گوارش جذب می شود و ظرف مدت ۲۰۰-۲۵ دقیقه در ماکیان و ۴۵-۹۰ دقیقه در بوقلمون به اوج غلظت پلاسمایی می رسد. قابلیت اتصال پلاسمائی آن در دوز درمانی ۸۵-۷۰% می باشد.

بی خطری: حتی اگر تا ۵ برابر دوز درمانی هم دارو مصرف گردد اثرات سوء و مسمومیت ندارد.

دوره پرهیز از مصرف: ■ **ماکیان:** ۵ روز ■ **بوقلمون:** ۱۲ روز

بسته بندی: سطل های از جنس پلی پروپیلن با درپوش های پلی پروپیلنی که محصول درون آن در کیسه های از جنس LDPE قرار دارد به وزن ۱۰۰ گرم، ۱ و ۵ کیلوگرم.

عمر قفسه ای:

■ لادوکسین تا ۲ سال پس از تولید زمان مصرف دارد.

■ چنانچه پلمپ محصول باز شود، ۳ ماه تاریخ مصرف خواهد داشت.

■ محلول رقیق و آماده مصرف محصول تا ۲۴ ساعت باید استفاده شود.

محصول را در همان ظرف مخصوص خود و در دمای اتاق و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری نمائید.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا