



Nobivac[®] DHPPi

واکسن چهارگانه مخصوص سگ

- تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- شروع سریع ایمنی در مدت ۷ روز
- قابل استفاده در دوران آبستنی و شیردهی



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® DHPPi

واکسن چهارگانه مخصوص سگ

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی ویروس عامل بیماری Canine Distemper سویه Onderstepoort با حداقل ۱۰^۴ TCID50 و ویروس عامل بیماری Canine Parvovirus سویه ۱۵۴ با حداقل ۱۰^۷ TCID50 و ویروس عامل بیماری آدنوویروس تیپ ۲ سویه Manhattan LPV3 با حداقل ۱۰^۴ TCID50 و ویروس عامل بیماری پارآتفلوانزای سگها سویه Cornell با حداقل ۱۰^{۵.۵} TCID50 می‌باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت‌یافته، به صورت لیوفیلیزه.

مورد مصرف: واکسن چهارگانه Nobivac® DHPPi به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه Canine Distemper Virus، Canine Parvovirus، Canine Adenovirus type 1 (هیپاتیت عفونی سگها)، بیماری تنفسی ناشی از Canine Adenovirus type 2، و Canine Parainfluenza در سگها می‌باشد.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی: ابتدا یک ویال واکسن Nobivac® DHPPi با یک ویال (۱ میلی لیتر) حلال Nobivac یا واکسن Nobivac Lepto ترکیب شود. محلول آماده شده به صورت زیرجلدی تزریق شود.

(۱) برنامه واکسیناسیون در مواردی که احتمال مواجهه توله سگ با پاروویروس/دیستمپر قبل از سن ۸-۱۰ هفتهگی وجود دارد و وضعیت MDA مشخص نیست:

Nobivac Puppy DP	۴ تا ۶ هفتهگی
Nobivac DHPPi	۸ تا ۱۰ هفتهگی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4 و Nobivac Lepto و واکسن هاری	۱۲ هفتهگی

(۲) برنامه واکسیناسیون در توله سگها، در مواردی که سن واکسیناسیون بین ۸-۱۰ هفتهگی باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، Nobivac Lepto و واکسن هاری	۸ تا ۱۰ هفتهگی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4 و Nobivac Lepto	۱۲ هفتهگی

(۳) در مواردی که توله سگ تا قبل از ۱۲ هفتهگی واکسینه نشده باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، Nobivac Lepto و واکسن هاری	۱۲ هفتهگی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4 و Nobivac Lepto	۱۴ تا ۱۶ هفتهگی

زمان شروع ایمنی و افزایش تیترا:

- برای ویروس‌های CDV، CAV2 و CPV یک هفته پس از تجویز
 - برای ویروس CPi، چهار هفته پس از تجویز
- ماندگاری ایمنی پس از واکسیناسیون، برای ویروس‌های CDV، CAV2 و CPV سه سال و برای CPi، تا یک سال پس از تجویز اولیه خواهد بود.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
 - واکسن باید طبق نظر دامپزشک دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
 - از تزریق داخل وریدی واکسن خودداری شود.
 - پس از آماده‌سازی، واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود. قبل از مصرف، اجازه داده شود تا دمای واکسن به تدریج به دمای اتاق (۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) برسد.
 - پس از واکسیناسیون اولیه، سگها نباید حداقل ۱۴ روز در معرض عفونت قرار بگیرند.
 - مطابق آیین‌نامه دفع زباله، تمام ویال‌های خالی واکسن دور ریخته شوند و تحت هیچ شرایطی مورد استفاده مجدد قرار نگیرند.
 - دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
- موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود.
- شرایط و مدت نگهداری: ۲۴ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.
- بسته‌بندی: به صورت ویال‌های شیشه‌ای و تک دزی واکسن Nobivac® DHPPi در بسته‌های ۱۰ یا ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد. شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا

Reference

- 1- Ellis, John, et al. "2022 AAHA canine vaccination guidelines." Journal of the American Animal Hospital Association 58.5 (2022): 213-230.

