

Nobivac[®] KC

واکسن Kennel Cough داخل بینی سگ

- شروع محافظت کامل به ترتیب با گذشت ۷۲ ساعت و سه هفته در مقابل Bordetella bronchiseptica و Canine Parainfluenza
- تنها واکسن داخل بینی محافظت کننده در برابر Kennel Cough با دوره ایمنی یک ساله
- جهت ایجاد ایمنی در تولدها از ۷۲ ساعت قبل از ورود به محل های پر خطر نظیر پناهگاه ها
- قابل استفاده از سن دو هفتگی به بعد
- ایمن به منظور استفاده در تمام دوره آبیستی



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® KC

واکسن Kennel Cough داخل بینی سگ

ترکیب واکسن: هر دز واکسن حاوی حداقل 1×10^{10} CFU و حداکثر 1×10^9 CFU از باکتری *Bordetella bronchiseptica* سویه B-C2 و حداقل $1 \times 10^{3.0}$ TCID50 و حداکثر $1 \times 10^{5.3}$ TCID50 از ویروس Canine Parainfluenza سویه Cornell می باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن داخل بینی زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه. مورد مصرف: واکسن داخل بینی Nobivac® KC به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری تنفسی عفونی ناشی از باکتری *Bordetella bronchiseptica* و ویروس Canine parainfluenza در سگها از سن دو هفتگی به بعد می باشد. ایجاد ایمنی علیه B. Bronchiseptica طی مدت ۷۲ ساعت و در مقابل ویروس Canine Parainfluenza با گذشت سه هفته پس از تجویز واکسن حاصل می شود.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی:

ابتدا یک دز واکسن Nobivac® KC با یک ویال حلال مخصوص به خوبی حل شده و سپس کل محلول آماده شده (۰/۴ میلی لیتر) با سرنگ استریل یک میلی لیتری کشیده می شود. سپس سر حیوان رو به بالا ثابت نگه داشته و پس از جدا کردن سر سوزن سرنگ، کل محلول (۰/۴ میلی لیتر) در یک سوراخ بینی سگ خالی می شود.

واکسن Nobivac® KC به مدت یک سال در مقابل علائم بالینی و عفونت ناشی از *Bordetella bronchiseptica* و ویروس Canine parainfluenza محافظت ایجاد می کند و توصیه می شود که به صورت سالانه تکرار شود. در سگهای واکسینه نشده، به منظور ایجاد محافظت در برابر ویروس canine parainfluenza، باید حداقل سه هفته پیش از قرار گرفتن در معرض خطر، مانند ورود موقتی به یک کنل یا سگدانی، یک دز از واکسن دریافت شود. در سگهای واکسینه نشده، به منظور ایجاد محافظت در برابر *Bordetella bronchiseptica*، باید حداقل ۷۲ ساعت پیش از قرار گرفتن در معرض خطر، یک دز از واکسن دریافت شود.

توصیهها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
- واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
- با هیچ گونه واکسن زنده و یا محصولات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.
- واکسن آماده شده باید ظرف مدت ۱ ساعت مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی اطلاع نگهداری شود.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگهای بیمار خودداری شود. به هیچ عنوان همزمان با سایر درمانهای داخل بینی یا در طول درمان آنتی بیوتیکی استفاده نگردد.

عوارض جانبی: در توله سگهای خیلی جوان، ترشحات خفیف چشم و بینی ممکن است پس از واکسیناسیون ایجاد شود. گاهی اوقات این ترشحات همراه با عطسه و سرفه هستند. علائم معمولاً گذرا بوده اما به ندرت تا ۴ هفته ادامه پیدا می کنند. در حیواناتی که علائم شدیدتری دارند ممکن است نیاز به درمان آنتی بیوتیکی باشد.

شرایط و مدت نگهداری: واکسن Nobivac® KC و حلال در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری شوند. قبل از استفاده، حلال واکسن باید به دمای محیط (۱۵-۲۵ درجه) برسد. عمر قفسه ای محصول ۲۷ ماه می باشد. بسته بندی: به صورت ویالهای شیشه ای و تک دزی واکسن همراه با حلال مخصوص Nobivac® KC در بسته های ۵ یا ۲۵ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می گردد.

شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا



NIKO GENE ARYA

Nikogene.com

info@npb.co.ir

۰۲۱-۵۲۸۹۵

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، شماره ۲۳



NIKAN PAKHSH BEH AFARIN