

Nobivac® L4

واکسن چهارگانه لیتوسپیرا

- تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- ایجاد ایمنی به مدت یک سال پس از تجویز واکسن
- شروع ایمنی ۳ هفته بعد از تزریق
- قابل استفاده در دوران آبستنی
- ایمنی زایی فعال در سگها برای کاهش عفونت و دفع ادراری ارگانسیم



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® L4

واکسن چهارگانه لپتوسپیرا

ترکیب واکسن: هر دز واکسن علیه بیماری لپتوسپیروز حاوی:

- L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vero (strain Ca-12-000) 3550–7100 U¹
- L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) 290–1000 U¹
- L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) 500–1700 U¹
- L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas (strain Gr-01-005) 650–1300 U¹

¹ بر اساس آنتیژن الایزا

شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی کشته.

مورد مصرف: واکسن کشته Nobivac® L4 جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری لپتوسپیروز ناشی از (*L. Dadas*, *L. Bratislava*, *L. Copenhageni*, *L. Canicola*) در سگ‌ها می‌باشد. این واکسن علاوه بر کاهش عفونت، منجر به کاهش دفع ادراری باکتری در حیوانات مبتلا می‌شود.

دز و نحوه مصرف:

یک ویال واکسن (۱ میلی‌لیتر) Nobivac® L4 به صورت زیرجلدی تزریق شود. اولین دز تزریق واکسن در ۶-۹ هفتگی و تزریق دوم در ۱۰-۱۳ هفتگی توصیه می‌شود. تجویز واکسیناسیون یادآور سالانه می‌باشد. در صورت استفاده همزمان، یک دز واکسن Nobivac® DHPPi شامل canine distemper virus، canine adenovirus type 2، canine parvovirus و canine parainfluenza virus با یک دز (۱ میلی‌لیتر) واکسن Nobivac® L4 مخلوط نمایید و قبل از استفاده اجازه دهید به دمای محیط (۱۵-۲۵ درجه سانتی‌گراد) برسد، سپس به صورت زیرجلدی تزریق گردد.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
 - واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
 - با هیچ گونه واکسن زنده و یا محصولات ایمونولوژیکی مخلوط نگردد.
 - دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
 - از ورود اشتباه سرنگ به فرد تزریق‌کننده یا تماس با چشم خودداری شود؛ در صورت تحریک چشم فوراً به پزشک مراجعه کنید و بروشور یا برچسب آن را به پزشک نشان دهید.
- موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود.

عوارض جانبی:

ممکن است یک تورم جزئی و موقت در محل تزریق چند روز پس از واکسیناسیون رخ دهد که در لمس سفت و دردناک است. این تورم ۱۴ روز پس از واکسیناسیون کم و یا ناپدید می‌شود. ممکن است افزایش ملایم دمای بدن و همچنین به‌ندرت در توله‌سگ‌ها کاهش فعالیت و اشتها پس از واکسیناسیون رخ دهد.

تداخل با سایر واکسن‌ها: واکسن Nobivac® L4 می‌تواند مخلوط با سایر واکسن‌های Nobivac، نظیر Nobivac® DHP و Nobivac® DHPPi به صورت زیرجلدی تزریق شود. وقتی با این واکسن‌ها به صورت مخلوط استفاده شود، از نظر کارایی و ایمنی تفاوتی با Nobivac® L4 به‌تنهایی ندارد. هیچ اطلاعاتی در مورد ایمنی و اثربخشی این واکسن در استفاده با سایر محصولات دامپزشکی به جز محصولات ذکر شده در بالا در دسترس نیست.

شرایط و مدت نگهداری: ۲۱ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.

بسته‌بندی: بسته‌بندی به صورت ویال‌های تک دزی واکسن Nobivac® L4 در بسته‌های ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد.

شرکت ثبت و وارد کننده انحصاری: نیکو ژن آریا



NIKO GENE ARYA

Nikogene.com

info@npb.co.ir

۰۲۱-۵۲۸۹۵

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، شماره ۲۳



NIKAN PAKHSH BEH AFARIN