



Nobivac[®] Puppy DP

واکسن دوگانه مخصوص توله‌سگ

- تهیه‌شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- قابل استفاده از سن چهار هفتگی
- ایجاد ایمنی اولیه و سریع در برابر بیماری Canine Parvovirus، Canine Distemper Virus
- کاهش ریسک ابتلا به بیماری در سنین پایین و در نتیجه ایمنی بالاتر در تعاملات اجتماعی اولیه با سگ‌های دیگر
- شروع ایمنی یک هفته پس از تجویز واکسن



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® Puppy DP واکسن دوگانه مخصوص توله‌سگ

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی ویروس عامل بیماری Canine Distemper سویه Onderstepoort با حداقل 10^6 TCID50 و ویروس عامل بیماری Canine Parvovirus سویه ۱۵۴ با حداقل 10^7 TCID50 می‌باشد.
شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت‌یافته، به‌صورت لیوفیلیزه.

مورد مصرف: واکسن دوگانه Nobivac® Puppy DP به‌منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری Canine Distemper Virus و Canine Parvovirus در توله‌سگ‌های جوان بوده و ایجاد ایمنی یک هفته پس از تجویز شروع می‌شود.
پس از تجویز Nobivac® Puppy DP در توله‌سگ‌ها باید ادامه واکسیناسیون مطابق برنامه ارائه‌شده تکرار شود.
دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی: ابتدا یک ویال واکسن با یک ویال (۱ میلی لیتر) حلال Nobivac ترکیب شود. محلول آماده‌شده باید به‌صورت زیرجلدی در ناحیه گردن یا قفسه سینه و با رعایت اصول آسپتیک تزریق شود.

(۱) برنامه واکسیناسیون در مواردی که احتمال مواجهه توله‌سگ با پاروویروس/دیستمپر قبل از سن ۸-۱۰ هفته‌گی وجود دارد و وضعیت MDA مشخص نیست:

Nobivac Puppy DP	۴ تا ۶ هفته‌گی
Nobivac DHPPi	۸ تا ۱۰ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، Nobivac Lepto و واکسن هاری	۱۲ هفته‌گی

(۲) برنامه واکسیناسیون در توله‌سگ‌ها، در مواردی که سن واکسیناسیون بین ۸-۱۰ هفته‌گی باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، Nobivac Lepto و واکسن هاری	۸ تا ۱۰ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4 و Nobivac Lepto	۱۲ هفته‌گی

(۳) در مواردی که توله‌سگ تا قبل از ۱۲ هفته‌گی واکسینه نشده باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، Nobivac Lepto و واکسن هاری	۱۲ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4 و Nobivac Lepto	۱۴ تا ۱۶ هفته‌گی

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید که واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
 - واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
 - از تزریق داخل‌وریدی واکسن خودداری شود.
 - پس از آماده‌سازی، واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود.
 - مطابق آیین‌نامه دفع زباله، تمام ویال‌های خالی واکسن دور ریخته شوند و تحت هیچ شرایطی مورد استفاده مجدد قرار نگیرند.
 - دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
- موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود.

شرایط و مدت نگهداری: ۲۴ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود. حلال Nobivac در دمای محیط نگهداری شود.

بسته‌بندی: به‌صورت ویال‌های شیشه‌ای و تک دزی واکسن همراه با حلال مخصوص Nobivac® Puppy DP در بسته‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد.
شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا



Reference

- 1- Ellis, John, et al. "2022 AAHA canine vaccination guidelines." Journal of the American Animal Hospital Association 58.5 (2022): 213-230.