



Nobivac[®] Tricat Trio

واکسن سه‌گانه مخصوص گربه

- تهیه‌شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- قابل استفاده از سن شش هفتگی
- ایمن بودن واکسن تا ده برابر دز توصیه شده
- ماندگاری ایمنی پس از واکسیناسیون، تا یک سال برای FCV و FHV و سه سال برای FPLV



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® Tricat Trio

واکسن سه‌گانه مخصوص گربه

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی $5.2 \text{ Log}_{10} \text{ PFU}$ از ویروس عامل بیماری هرپس ویروس تیپ I، سویه G2620A و $4.6 \text{ Log}_{10} \text{ PFU}$ ویروس عامل بیماری کلیسی ویروس (FCV) سویه F9 و $4.3 \text{ Log}_{10} \text{ CCID}_{50}$ ویروس عامل بیماری پن‌لکوپنی (FPLV) سویه MW-1 می‌باشد. شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت‌یافته، به صورت لیوفیلیزه.

مورد مصرف: واکسن سه‌گانه Nobivac® Tricat Trio جهت ایمنی فعال در بچه گربه‌های سالم از سن هشت هفتگی، به منظور کاهش علائم بالینی ناشی از عفونت با Feline Calicivirus و Feline Herpes Virus و جلوگیری از بروز علائم بالینی و دفع ویروس لکوپنی ناشی از Feline Panleukopenia virus در گربه‌ها.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی: ابتدا یک ویال واکسن با یک ویال (۱ میلی لیتر) حلال مخصوص Nobivac® Tricat Trio ترکیب شود. تمام محتوای واکسن به صورت زیرجلدی تزریق شود.

(۱) اگر انجام واکسیناسیون در زمان زودتر مطلوب یا ضروری باشد، واکسیناسیون از سن ۶ هفتگی به بعد مناسب است، و سپس در سن ۸-۹ هفتگی و ۱۲ هفتگی تکرار شود:

۶ هفتگی	Nobivac® Tricat Trio
۸ تا ۹ هفتگی	Nobivac® Tricat Trio
۱۲ هفتگی	Nobivac® Tricat Trio به همراه هاری

(۲) برای واکسیناسیون در شرایط کم خطر، دو دز با فاصله ۳ تا ۴ هفته مورد نیاز است:

۸ تا ۹ هفتگی	Nobivac® Tricat Trio
۱۲ هفتگی	Nobivac® Tricat Trio به همراه هاری

زمان شروع ایمنی و افزایش تیتراژ:

- برای ویروس‌های FCV و FHV، ۴ هفته
- برای FPLV، ۳ هفته

ماندگاری ایمنی پس از واکسیناسیون، برای FCV و FHV، یک سال و برای FPLV، ۳ سال می‌باشد.

تکرار واکسیناسیون:

برای FCV و FHV به صورت تک دز و سالانه می‌باشد. تکرار واکسیناسیون برای FPLV اگرچه هر سه سال یکبار است، اما در شرایط پر خطر تکرار سالیانه باید انجام شود.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید که واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
- واکسن باید طبق نظر دکتر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
- با هیچ گونه واکسن دیگر مخلوط نگردد.
- مطابق آیین‌نامه دفع زباله، تمام ویال‌های خالی واکسن دور ریخته شوند و تحت هیچ شرایطی مورد استفاده مجدد قرار نگیرند.
- دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
- پس از آماده‌سازی، واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود.
- ممکن است برای مدت ۱ تا ۲ روز محل تجویز متورم و دردناک باشد و در اولین روز بعد از واکسیناسیون دمای بدن (کمتر از ۴۰ درجه) افزایش پیدا کند.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون گربه‌های بیمار، گربه‌های آبستن و گربه‌های شیرده خودداری شود.

شرایط و مدت نگهداری: واکسن در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از فریز کردن محصول خودداری شود. ماندگاری واکسن در بسته‌بندی کارخانه‌ای تا ۳۳ ماه و حلال تا ۵ سال می‌باشد.

بسته‌بندی: به صورت ویال‌های شیشه‌ای و تک دزی واکسن همراه با حلال Nobivac® Tricat Trio در بسته‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد.

شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا



NIKO GENE ARYA

Nikogene.com

info@npb.co.ir

۰۲۱-۵۲۸۹۵

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، شماره ۲۳



NIKAN PAKHSH BEH AFARIN