



BRAVECTO® chewable tablets for dogs

قرص جویدنی ضد کک و کنه براوکتو

- کنترل و درمان کک و کنه (درمان قطعی طی ۸ تا ۱۲ ساعت)
- دوره ایمنی ۳ ماهه متعاقب مصرف برای انواع کک و کنه
- تنها ترکیب قابل استفاده در دوران آبستنی و شیردهی و سگهای مولد
- قابلیت استفاده تا ۵ برابر دز توصیه شده بدون ایجاد عوارض جانبی
- ایمن برای استفاده در نژادهای MDR ۱ (نژادهای حساس به مصرف آئورمکتین)
- کمک به کنترل درماتیت آلرژیک ناشی از کک (Flea Allergy Dermatitis) و درمان کرم نواری دیپیلیدیوم کینوم
- موثر در برابر ککهای مقاوم به سایر ترکیبات ضد انگل خارجی
- موثر در پیشگیری از بیماریهای منتقله از کنه (بابزیوز)



Veterinary
Medicines
Directorate

FDA
APPROVED



BRAVECTO® Chewable Tablets for Dogs

گروه دارویی: ضد انگل؛ به صورت قرص خوراکی؛ محتوی ماده مؤثره Fluralaner
گونه هدف: سگ

موارد مصرف: جهت کنترل و درمان آلودگی به کک و کنه در سگها
اطلاعات کلی:

BRAVECTO® حاوی Fluralaner، یک حشره کش و کنه کش سیستمیک با مدت اثر طولانی است که فعالیت کشندگی سریع و مداوم خود را برای مدت ۳ ماه در کنه های بالغ و جوان (ایکسودس ریسینوس، ایکسودس هگزاگونوس، ایکسودس اسکپولاریس، ایکسودس هولوسیکلوس، درماستور رتیکولاتوس، درماستور واریبیلیس و ریپیسفالوس سانگوینئوس) و ککها (*Ctenocephalides* و *Ctenocephalides felis*) فراهم می کند.

آزمایش های کنترل شده نشان داده اند که پس از درمان با BRAVECTO®، ۹۶/۸ درصد از کنه ها بر روی بدن سگ طی مدت ۸ ساعت و ۱۰۰ درصد کنه ها طی مدت ۱۲ ساعت از بین می روند. ۳ ماه پس از درمان، حدود ۹۷/۱ درصد از کنه های جدید طی مدت ۱۲ ساعت کشته می شوند. متعاقب درمان با BRAVECTO®، ۹۹ درصد از کک های روی بدن سگ طی مدت ۸ ساعت و ۱۰۰ درصد آنها طی مدت ۱۲ ساعت از بین می روند. ۳ ماه پس از درمان، ۹۵/۷ درصد کک های جدید که بر روی بدن سگ قرار می گیرند، طی مدت ۸ ساعت از بین می روند.

فارماکوکینتیک: Fluralaner پس از مصرف خوراکی، به راحتی جذب شده و به حداکثر غلظت پلاسما طی یک روز می رسد. Fluralaner به صورت سیستمی توزیع می شود و به بالاترین غلظت در چربی و سپس کبد، کلیه و عضلات می رسد. ماندگاری طولانی، حذف آهسته از پلاسما و فقدان متابولیسم گسترده، غلظت مؤثر Fluralaner را در طول فاصله بین هر تجویز (ایتروال) فراهم می کند.

روش مصرف:

اگر وزن بدن سگ

۴۰ تا ۵۶ کیلوگرم باشد (خیلی بزرگ)  قرص ۱۴۰۰ میلی گرمی	۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم باشد (بزرگ)  قرص ۱۰۰۰ میلی گرمی	۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم باشد (متوسط)  قرص ۵۰۰ میلی گرمی	۴/۵ تا ۱۰ کیلوگرم باشد (کوچک)  قرص ۲۵۰ میلی گرمی	۲ تا ۴/۵ کیلوگرم باشد (خیلی کوچک)  قرص ۱۱۲/۵ میلی گرمی
---	--	--	---	--

قرص جویدنی براوکتو در ۵ سایز با توجه به وزن حیوانات قابل مصرف است. در هر گروه وزنی ۱ قرص کامل باید توسط سگ خورده شود. مصرف قرص با معده پر می باشد. در صورتی که حیوان از جویدن قرص امتناع کرد، می توان قرص را به همراه غذا و یا مستقیماً درون دهان حیوان قرار داد. برای سگ هایی که وزنی بیشتر از ۵۶ کیلوگرم دارند، از ترکیب دو قرص که نزدیک به وزن بدن سگ باشد، استفاده نمایید.

برای کنترل بهینه آلودگی با کک و کنه، قرص جویدنی BRAVECTO® باید در فواصل ۳ ماهه تجویز شود. برای درمان جرب دمودکس کنیس (*Demodex canis*) یک دز از محصول تجویز شود. از آنجایی که دمودکوزیس اغلب دارای عامل زمینه ای است، توصیه می شود اقدام به شناسایی و درمان عامل زمینه ای نیز صورت گرفته شود. برای درمان جرب سارکوپتیس (*Sarcoptes scabiei*)، یک دز از محصول تجویز شود. تکرار و دفعات درمان بر اساس نسخه دامپزشک باشد.

موارد عدم مصرف: این ترکیب در توله سگ های کمتر از ۸ هفته یا وزن کمتر از ۲ کیلوگرم نباید استفاده شود. در صورت حساسیت به ماده فعال یا هر یک از مواد دیگر، از مصرف قرص خودداری کنید. در فواصل زمانی کمتر از ۸ هفته استفاده نشود. همچنین، در صورت رخداد هرگونه حالت غیرطبیعی و ایجاد نگرانی به دامپزشک مراجعه کنید.

عمر قفسه ای: ۲ سال در دمای محیط به دور از مواد غذایی و همچنین در بسته بندی اصلی برای جلوگیری از رطوبت نگهداری شود. بسته بندی: جعبه های مقوایی حاوی ورق های قرص (۱، ۲ یا ۴ عددی) که هر دو طرف ورقها آلومینیومی است. شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا



NIKO GENE ARYA

Nikogene.com

info@npb.co.ir

۰۲۱-۵۲۸۹۵

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، شماره ۲۳



NIKAN PAKHSH BEH AFARIN