



Nobivac[®] DHPPi

واکسن چهارگانه مخصوص سگ

- تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- شروع سریع ایمنی در مدت ۷ روز
- قابل استفاده در دوران آبستنی و شیردهی



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® DHPPi واکسن چهارگانه مخصوص سگ

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی ویروس عامل بیماری Canine Distemper سویه Onderstepoort با حداقل ۱۰^۴ TCID50 و ویروس عامل بیماری Canine Parvovirus سویه ۱۵۴ با حداقل ۱۰^۷ TCID50 و ویروس عامل بیماری آدنوویروس تیپ ۲ سویه Manhattan LPV3 با حداقل ۱۰^۴ TCID50 و ویروس عامل بیماری پارائفلوانزای سگها سویه Cornell با حداقل ۱۰^{۵.۵} TCID50 می باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه.

مورد مصرف: واکسن چهارگانه Nobivac® DHPPi به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه Canine Adenovirus type 1، Canine Parvovirus، Canine Distemper Virus (هیپاتیت عفونی سگها)، بیماری تنفسی ناشی از Canine Adenovirus type 2، و Canine Parainfluenza در سگها می باشد.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی: ابتدا یک ویال واکسن Nobivac® DHPPi با یک ویال (۱ میلی لیتر) حلال Nobivac یا واکسن Nobivac Lepto ترکیب شود. محلول آماده شده به صورت زیرجلدی تزریق شود.

(۱) برنامه واکسیناسیون در مواردی که احتمال مواجهه توله سگ با پاروویروس/دیستمپر قبل از سن ۸-۱۰ هفتگی وجود دارد و وضعیت MDA مشخص نیست:

Nobivac KC	۲ هفتگی
Nobivac Puppy DP	۴ تا ۶ هفتگی
Nobivac DHPPi	۸ تا ۱۰ هفتگی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری	۱۲ تا ۱۴ هفتگی

(۲) برنامه واکسیناسیون در توله سگها، در مواردی که سن واکسیناسیون بین ۸-۱۰ هفتگی باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و Nobivac KC	۸ تا ۱۰ هفتگی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری	۱۲ تا ۱۴ هفتگی

(۳) در مواردی که توله سگ تا قبل از ۱۲ هفتگی واکسینه نشده باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری، Nobivac KC	۱۲ هفتگی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4	۱۴ تا ۱۶ هفتگی

زمان شروع ایمنی و افزایش تیتراژ:

- برای ویروس های CDV، CAV2 و CPV یک هفته پس از تجویز و برای ویروس CPi، چهار هفته پس از تجویز. ماندگاری ایمنی پس از واکسیناسیون، برای ویروس های CDV، CAV2 و CPV سه سال و برای CPi، تا یک سال پس از تجویز اولیه خواهد بود.

توصیه ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
- واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
- از تزریق داخل وریدی واکسن خودداری شود.
- پس از آماده سازی، واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود. قبل از مصرف، اجازه داده شود تا دمای واکسن به تدریج به دمای اتاق (۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد) برسد.
- پس از واکسیناسیون اولیه، سگها نباید حداقل ۱۴ روز در معرض عفونت قرار بگیرند.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگهای بیمار خودداری شود.

شرایط و مدت نگهداری: ۲۴ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.

بسته بندی: به صورت ویال های شیشه ای و تک دزی واکسن Nobivac® DHPPi در بسته های ۱۰ یا ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می گردد. **شرکت ثبت و واردکننده انحصاری:** نیکو ژن آریا

Reference

- 1- Squires, R. A., Crawford, C., Marcondes, M., & Whitley, N. (2024). 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats—compiled by the Vaccination Guidelines Group (VGG) of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Journal of Small Animal Practice, 65(5), 277-316.

