

Nobivac® KC

واکسن Kennel Cough داخل بینی سگ

- شروع محافظت کامل به ترتیب با گذشت ۷۲ ساعت و سه هفته در مقابل *Bordetella bronchiseptica* و Canine Parainfluenza
- تنها واکسن داخل بینی محافظت کننده در برابر Kennel Cough با دوره ایمنی یک ساله
- جهت ایجاد ایمنی در تولدها از ۷۲ ساعت قبل از ورود به محل های پر خطر نظیر پناهگاه ها
- قابل استفاده از سن دو هفتگی به بعد
- ایمن به منظور استفاده در تمام دوره آبیستی



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® KC

واکسن Kennel Cough داخل بینی سگ

ترکیب واکسن: هر دز واکسن حاوی حداقل $10^{8.0}$ CFU و حداکثر $10^{9.7}$ CFU از باکتری *Bordetella bronchiseptica* سویه B-C2 و حداقل $10^{3.0}$ TCID50 و حداکثر $10^{5.3}$ TCID50 از ویروس Canine Parainfluenza سویه Cornell می‌باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن داخل بینی زنده تخفیف حدت یافته، به صورت لیوفیلیزه.
مورد مصرف: واکسن داخل بینی Nobivac® KC به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری تنفسی عفونی ناشی از باکتری *Bordetella bronchiseptica* و ویروس Canine parainfluenza در سگ‌ها از سن دو هفتهگی به بعد می‌باشد. ایجاد ایمنی علیه *Bordetella bronchiseptica* طی مدت ۷۲ ساعت و در مقابل ویروس Canine parainfluenza با گذشت سه هفته پس از تجویز واکسن حاصل می‌شود.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی:

ابتدا یک دز واکسن Nobivac® KC با یک ویال حلال مخصوص به خوبی حل شده و سپس کل محلول آماده شده (۰/۴ میلی‌لیتر) با سرنگ استریل یک میلی‌لیتری کشیده می‌شود. سپس سر حیوان رو به بالا ثابت نگه داشته و پس از جدا کردن سر سوزن سرنگ، کل محلول (۰/۴ میلی‌لیتر) در یک سوراخ بینی سگ خالی می‌شود.
واکسن Nobivac® KC به مدت یک سال در مقابل علائم بالینی و عفونت ناشی از *Bordetella bronchiseptica* و ویروس Canine parainfluenza محافظت ایجاد می‌کند و توصیه می‌شود که به صورت سالانه تکرار شود. در سگ‌های واکسینه نشده، به منظور ایجاد محافظت در برابر ویروس Canine parainfluenza، باید حداقل سه هفته پیش از قرار گرفتن در معرض خطر، مانند ورود موقتی به یک کنل یا سگدانی، یک دز از واکسن باید دریافت شود. در سگ‌های واکسینه نشده، به منظور ایجاد محافظت در برابر *Bordetella bronchiseptica*، باید حداقل ۷۲ ساعت پیش از قرار گرفتن در معرض خطر، یک دز از واکسن باید دریافت شود.

برنامه واکسیناسیون جامع پیشنهادی با توجه به آخرین راهنمای واکسیناسیون سگ‌ها:

Nobivac KC	۲ هفتهگی
Nobivac Puppy DP	۴ تا ۶ هفتهگی
Nobivac DHPPI همراه با Nobivac L4	۸ تا ۱۰ هفتهگی
Nobivac DHPPI همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری	۱۲ هفتهگی

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
 - واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
 - واکسن آماده شده باید ظرف مدت ۱ ساعت مصرف شود.
 - دور از دسترس کودکان، حیوانات و افراد بی‌اطلاع نگهداری شود.
- موارد منع مصرف:** از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود. به هیچ عنوان همزمان با سایر درمان‌های داخل بینی یا در طول درمان آنتی‌بیوتیکی استفاده نگردد.
- عوارض جانبی:** در توله‌سگ‌های خیلی جوان، ترشحات خفیف چشم و بینی ممکن است پس از واکسیناسیون ایجاد شود. گاهی اوقات این ترشحات همراه با عطسه و سرفه هستند.
- شرایط و مدت نگهداری:** واکسن Nobivac® KC و حلال در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور حمل و نگهداری شوند. قبل از استفاده، حلال واکسن باید به دمای محیط (۱۵-۲۵ درجه) برسد. عمر قفسه‌ای محصول ۲۷ ماه می‌باشد.
- بسته‌بندی:** به صورت ویال‌های شیشه‌ای و تک دزی واکسن همراه با حلال مخصوص Nobivac® KC در بسته‌های ۵ یا ۲۵ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد.
- شرکت ثبت و واردکننده انحصاری: نیکو ژن آریا

