



Nobivac[®] DHPPi

واکسن پنج‌گانه مخصوص سگ

- تهیه شده با بالاترین کیفیت و تکنولوژی برتر دنیا
- شروع سریع ایمنی در مدت ۷ روز
- قابل استفاده در دوران آبستنی و شیردهی



Veterinary
Medicines
Directorate



Nobivac® DHPPi

واکسن پنج‌گانه سگ

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن حاوی ویروس عامل بیماری Canine Distemper سویه Onderstepoort با حداقل 10^4 TCID50 و ویروس عامل بیماری Canine Parvovirus سویه 154 با حداقل 10^7 TCID50 و ویروس عامل بیماری آدنوویروس تیپ ۲ سویه Manhattan LPV3 با حداقل 10^4 TCID50 و ویروس عامل بیماری پارائفلوانزای سگ‌ها سویه Cornell با حداقل $10^{5.5}$ TCID50 می‌باشد.

شکل و نوع واکسن: واکسن تزریقی زنده تخفیف حدت‌یافته، به صورت لیوفیلیزه.

مورد مصرف: واکسن پنج‌گانه Nobivac® DHPPi به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه Canine Adenovirus type 1، Canine Parvovirus، Canine Distemper Virus (هیپاتیت عفونی سگ‌ها)، بیماری تنفسی ناشی از Canine Adenovirus type 2، و Canine Parainfluenza در سگ‌ها می‌باشد.

دز، نحوه مصرف و برنامه واکسیناسیون پیشنهادی: ابتدا یک ویال واکسن Nobivac® DHPPi با یک ویال (۱ میلی لیتر) حلال Nobivac یا واکسن Nobivac Lepto ترکیب شود. محلول آماده‌شده به صورت زیرجلدی تزریق شود.

(۱) برنامه واکسیناسیون در مواردی که احتمال مواجهه توله‌سگ با پاروویروس/دیستمپر قبل از سن ۸-۱۰ هفته‌گی وجود دارد و وضعیت MDA مشخص نیست:

Nobivac KC	۲ هفته‌گی
Nobivac Puppy DP	۴ تا ۶ هفته‌گی
Nobivac DHPPi	۸ تا ۱۰ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری	۱۲ تا ۱۴ هفته‌گی

(۲) برنامه واکسیناسیون در توله‌سگ‌ها، در مواردی که سن واکسیناسیون بین ۸-۱۰ هفته‌گی باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و Nobivac KC	۸ تا ۱۰ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری	۱۲ تا ۱۴ هفته‌گی

(۳) در مواردی که توله‌سگ تا قبل از ۱۲ هفته‌گی واکسینه نشده باشد:

Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4، و واکسن هاری، Nobivac KC	۱۲ هفته‌گی
Nobivac DHPPi همراه با Nobivac L4	۱۴ تا ۱۶ هفته‌گی

زمان شروع ایمنی و افزایش تیتراژ:

- برای ویروس‌های CDV، CAV2 و CPV یک هفته پس از تجویز و برای ویروس CPi، چهار هفته پس از تجویز. ماندگاری ایمنی پس از واکسیناسیون، برای ویروس‌های CDV، CAV2 و CPV سه سال و برای CPi، تا یک سال پس از تجویز اولیه خواهد بود.

توصیه‌ها و احتیاطات لازم:

- دقت کنید واکسن از شبکه توزیع رسمی تهیه شده باشد.
- واکسن باید طبق نظر دامپزشک و فقط در حیوان سالم، پس از انجام معاینات لازم تجویز شود.
- از تزریق داخل‌وریدی واکسن خودداری شود.
- پس از آماده‌سازی، واکسن طی مدت ۳۰ دقیقه مصرف شود. قبل از مصرف، اجازه داده شود تا دمای واکسن به تدریج به دمای اتاق (۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد) برسد.
- پس از واکسیناسیون اولیه، سگ‌ها نباید حداقل ۱۴ روز در معرض عفونت قرار بگیرند.

موارد منع مصرف: از واکسیناسیون سگ‌های بیمار خودداری شود.

شرایط و مدت نگهداری: ۲۴ ماه، در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و دور از نور، حمل و نگهداری شود.

بسته‌بندی: به صورت ویال‌های شیشه‌ای و تک دزی واکسن Nobivac® DHPPi در بسته‌های ۱۰ یا ۵۰ عددی توسط شرکت MSD هلند تولید می‌گردد. **شرکت ثبت و واردکننده انحصاری:** نیکو ژن آریا

Reference

- 1- Squires, R. A., Crawford, C., Marcondes, M., & Whitley, N. (2024). 2024 guidelines for the vaccination of dogs and cats—compiled by the Vaccination Guidelines Group (VGG) of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). *Journal of Small Animal Practice*, 65(5), 277-316.



NIKO GENE ARYA

Nikogene.com

info@npb.co.ir

۰۲۱-۵۲۸۹۵



NIKAN PAKHSH BEH AFARIN

تهران، میدان توحید، خیابان امیرلو، کوچه محمدی، شماره ۲۳